

CRITERI DI ESCLUSIONE TEMPORANEA ALLA DONAZIONE

Aborto	6 mesi
Agopuntura, se non eseguita in ambienti certificati (chiedere certificazione)	4 mesi
Allergia a farmaci specialmente penicillina (dopo ultima esposizione)	1 anno
Allergia con terapia orale	idoneo
Alluce valgo	4 mesi
Anoressizzanti	1 mese
Antiacidi	idoneo
Antibiotici (dal termine assunzione)	15 giorni
Antifebbre gialla (batteri o virus vivi attenuati)	1 mese
Antimicotici (dal termine assunzione)	15 giorni
Antimorbillo , antiparotite , antirosolia	1 mese
Antinfiammatori tipo Aulin	5 giorni
Antipolio (orale)	1 mese
Antirabbica	1 anno
Antispastici (previa valutazione dello stato di salute)	7 giorni
Antistaminici	idoneo
Antitetanica (vaccino e immunoglobuline)	1 anno
Antitetanica (solo vaccino)	1 mese
Antivaiolo	1 mese
Appendicectomia	1 mese
Artroendoscopie	4 mesi
Asma asintomatica	idoneo
Aspirina (saltuaria)	5 giorni
Asportazione cisti cutanee	1 mese
Asportazione neoformazione cutanea	1 mese
BCG, febbre gialla, siero di origine animale	1 mese
Brucellosi (dopo guarigione definitiva)	2 anni

CRITERI DI ESCLUSIONE TEMPORANEA ALLA DONAZIONE

Calo di peso non giustificato	consulto medico
CMV (dopo guarigione)	1 anno
Colposcopia esplorativa	1 mese
Contatto diretto con epatici conviventi (dall'ultimo contatto)	4 mesi
Cortisonici uso sistemico (compresse, iniezioni, dal termine cura)	15 giorni
Cortisonici uso topico (creme, lozioni , spray)	idoneo
Cure dentarie : estrazioni dentarie semplici, devitalizzazioni, otturazioni con anestesia e analoghi	7 giorni
Cure dentarie : implantologia	4 mesi
Cure dentarie : otturazioni e pulizia dentale	48 ore
Diabete de non insulino dipendente	idoneo
Emorroidectomia	4 mesi
Endoscopia o uso di catetere	4 mesi
Eparina a basso peso molecolare (da termine cura)	7 giorni
Epatite A (dopo guarigione, con Alt neg,IgG pos, IgM negative)	1 anno
Ernia inguinale	4 mesi
Esposizione accidentale al sangue o a strumenti contaminati da sangue	4 mesi
Febbre > di 38 gradi (da guarigione)	15 giorni
Febbre Q	2 anni
Fratture esposte di ossa grandi	6 mesi
Glomerulonefrite acuta (GNF) : dopo guarigione definitiva	5 anni
Influenza (da guarigione)	15 giorni
Interventi su cute e annessi	1 mese
Ipocolesterolemizzanti	idoneo
Legatura emorroidi	1 mese
Liposuzione	4 mesi
Malaria (dopo guarigione solo plasmaferesi)	fino alla guarigione

CRITERI DI ESCLUSIONE TEMPORANEA ALLA DONAZIONE

Malattia di Lyme (dopo guarigione)	6 mesi
Malattie allergiche	sospensione durante fase acuta
Malattie cardiovascolari	consulto medico
Malattie della tiroide	consulto medico
Malattie gastrointestinali quali coliti, gastriti, ulcera	fino alla guarigione
Malattie infettive acute (1 mese dalla guarigione)	1 mese
Mononucleosi (dopo guarigione)	6 mesi
Orticaria	7 giorni
Osteomielite (dopo guarigione definitiva)	2 anni
Parto e aborto dopo il 4° mese	1 anno
Piercing e Tatuaggi	4 mesi
Placche ortopediche	4 mesi
Polipectomia nasale / setto nasale	4 mesi
Psoriasi	consulto medico
Puntura di zecca (Riammissione dopo 3 mesi con assenza di malattia)	3 mesi
Raffreddore	7 giorni
Rapporti sessuali occasionali con persone a rischio di trasmissione malattie infettive (HBV UCV HIV LUE)	4 mesi
Reumatismo articolare acuto (dopo guarigione definitiva)	2 anni
Safenectomia	1 mese
Sedativi, antidepressivi fino a 20 gocce oltre consulto medico	idoneo
Sifilide (dopo guarigione)	1 anno
Soggiorno in zone di malattia tropicali (dopo rientro senza sintomi)	3 mesi
Soggiorno in zone malariche per oltre 5 anni (dal rientro senza sintomi, poi solo plasmaferesi)	3 anni
Somministrazione di siero di origine animale	4 mesi

CRITERI DI ESCLUSIONE TEMPORANEA ALLA DONAZIONE

Terapia desensibilizzante sottocutanea per malattie allergiche	72 ore
Terapia ormonale sostitutiva (danazol) pillola anticoncezionale	idoneo
Tonsillectomia	1 mese
Toxoplasmosi (dopo guarigione)	6 mesi
Toxoplasmosi (dopo guarigione ed in assenza di Ab IgM)	2 anni
Trait talassemico (solo plasmaferesi)	idoneo
Trasfusione di sangue, emoderivati, trapianto di tessuto e/o cellule staminali	4 mesi
Tubercolosi (dopo guarigione definitiva)	2 anni
Tunnel carpale	4 mesi
Tutti gli interventi maggiori (tranne altri nell'elenco)	4 mesi
Uso di farmaci: Proscar, Prostide (finasteride, triptorelina), Avodart (dutasteride), Roaccutan, Aisoskin (isotretinoina), Decapeptil (triptorelina)	2 mesi (da termine c+B46ura)
Varicocele	4 mesi
Vertigini e Labirintiti	fino alla guarigione
Viaggi in zone endemiche per malattie tropicali (previa valutazione dello stato di salute del donatore)	3 mesi
Virus del Nilo occidentale	1 mese
Visitatori asintomatici di aree ad endemia malarica che non si sottopongono a plasmaferesi (dal reintro senza sintomi)	6 mesi
Ciclo mestruale (dal termine)	5 giorni

NOTA BENE : per qualsiasi chiarimento o dubbio rivolgersi direttamente ai medici del Servizio Trasfusionale al n.° telefonico della segreteria del SIMT 031 58 55 396 dalle ore 11.00 alle 13.00 tutti i giorni escluso le domeniche.